Partie I : LA MATIÈRE

- Savoir identifier un solvant et un soluté
- Connaître et utiliser la notion de concentration
- Savoir préparer une solution par dissolution ou par dilution
- Savoir déterminer une concentration expérimentalement
- Connaître le principe de dosage par étalonnage

Chapitre 2

Composition des solutions aqueuses

I. Concentration en masse

En chimie, une solution est le mélange d'un solvant et d'un ou plusieurs solutés.

A retenir :

La concentration en masse d'une solution est

la masse de soluté par litre de solution :

m : masse du soluté (g) V : volume de la solution (L)

$$C_m = \frac{m}{V}$$

Exercice 1 : On introduit une masse $m = 1\text{ g}$ de sel dans un récipient contenant un volume $V = 1/2\text{ L}$ d'eau.

- Déterminer le solvant et le soluté lors de cette dissolution.
- Déterminer la concentration en masse de cette solution en g/L.

Remarque :

- Une solution dont le solvant principal est l'eau est appelée **solution aqueuse**.
- La solubilité est la concentration en masse maximum d'un soluté dans un solvant

Exercice 2 : Le Doliprane 500 est un médicament contenant 500 mg de paracétamol par comprimé.

Le paracétamol utilisé dans le traitement des douleurs légères à modérées et/ou dans les états fébriles.

- On dissout un comprimé dans un verre d'eau. Le volume final de la solution après dissolution est de 12 cL. Déterminer la concentration en masse C_m de cette solution en paracétamol.
- Chez les enfants, on ne doit pas dépasser 10 mg de paracétamol par kg de masse corporelle lors d'une prise.
Quelle masse maximale de paracétamol par prise peut-on donner à un enfant de 10 kg ?

II. Préparation d'une solution aqueuse

II.1 La dissolution

Lors d'une dissolution, on dissout un soluté dans un solvant.

Question : Commenter chaque étape numérotée.

A noter :

- Si la solution obtenue contient des ions, on parle de **solution ionique**. Ex : eau salée : $\text{H}_2\text{O} + \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
- Si la solution obtenue contient des molécules, on parle de **solution moléculaire**. Ex : eau sucrée : $\text{H}_2\text{O} + \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$

Exercice 3 : On veut préparer un volume de 100 mL d'une solution aqueuse de glucose de concentration en masse $C_m = 20 \text{ g/L}$. Quelle masse de glucose doit-on prélever ?

II.2 La dilution

Une dilution est la diminution de la concentration d'une solution par ajout de solvant sans ajout de soluté.

Question : Commenter chaque étape numérotée.

• Au cours d'une **dilution**, la masse de soluté prélevé dans la solution mère est égale à la masse du soluté présent dans la solution fille : $m_{\text{mère}} = m_{\text{fille}}$

$$C_{m\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{m\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$$

On demande souvent de diluer **F** fois une solution. **F** s'appelle le **facteur de dilution**

$$F = C_{m\text{mère}} / C_{m\text{fille}} = V_{\text{fille}} / V_{\text{mère}}$$

III. Détermination de concentrations

III.1 Echelle de teintes

Lorsqu'une espèce colorée est diluée, sa couleur devient plus claire. Une échelle de teintes consiste à préparer une série de solutions de concentrations connues de la même espèce colorée. On peut ensuite comparer avec la couleur de la solution de concentration inconnue et obtenir un encadrement de la valeur.

Exemple : solutions de permanganate de potassium

On obtient $0,01 \text{ g/L} \leq C_{mT} \leq 0,04 \text{ g/L}$.

III.2 Dosage par d'étalonnage

Le dosage par d'étalonnage est une technique qui permet de déterminer la concentration massique d'une espèce chimique dissoute dans une solution.

Protocole expérimental :

- Préparer une série de solutions de concentrations en masse C_m connues d'une même espèce.
- Mesurer la grandeur physique G pour chacune d'entre elles (exemple masse volumique).
- Tracer la courbe d'étalonnage, dont l'abscisse correspond à la concentration en masse des solutions connues et l'ordonnée correspond à la grandeur physique mesurée.

- Mesurer la grandeur physique G_x correspondant à la solution de concentration en masse inconnue
- Déterminer la concentration en mass C_{mX} de cette solution grâce à la courbe d'étalonnage.